

Klinika za reumatske bolesti i rehabilitaciju
Referentni centar MZSS RH za reumatoidni artritis
Klinički bolnički centar Zagreb ♦ Kišpatićeva 12 ♦ 10000 Zagreb

PRIMJENA INTRAVENSKE TERAPIJE - RITUKSIMAB (MABTHERA®)

Ana Obidić ♦ Branka Rimac ♦ Josipa Vujanić

U liječenju reumatoidnog artritisa putem intravenske terapije primjenjuje se MabThera® u kombinaciji s metotreksatom. Indicirana je za liječenje odraslih bolesnika s aktivnim reumatoidnim artritismom koji su imali neučinkovit odgovor ili nisu podnosili druge protureumatske lijekove koji mijenjaju bolest (DMARD-i), uključujući jednu ili više vrsta terapije. Ciklus liječenja MabTherom® sastoji se od dvije intravenske infuzije od 1000 mg. Preporučena doza MabThera® je 1000 mg primijenjenih putem intravenske infuzije, nakon kojih se dva tjedna kasnije istim načinom primjenjuje drugih 1000 mg. Cikluse liječenja MabTherom® moguće je ponavljati. Ovisno o znakovima i simptomima bolesti liječnik će odlučiti kada bolesnik mora ponovo primiti MabThera®. Infuziju MabThera® treba primijeniti odmah po pripremi. KBC Zagreb ima centralnu pripremu

citostatika, a već pripremljena MabThera® se doprema do odjela. Tijekom aplikacije lijeka nužno je promatrati bolesnika kako bi se na vrijeme uočile moguće reakcije. Obvezatno je 30 minuta prije svake primjene infuzije MabThera® bolesniku intravenski dati 100 mg metilprednizolona kako bi se smanjila učestalost i jačina akutnih reakcija na infuziju. Također je potrebno prije svake infuzije MabThera® primijeniti antipiretik i antihistaminik. Osobitu pažnju potrebno je posvetiti prepoznavanju kontraindikacija kao što su: preosjetljivost na aktivni sastojak ili na koju pomoćnu tvar, aktivne infekcije, zatajenje srca ili uznapredovala nekontrolirana srčana bolest. Infuzija MabThera® fizički i kemijski je stabilna 24 sata pri temperaturi od 2-8°C.

Glavne riječi: reumatoidni artritis, intravenska terapija, rituksimab (MabThera®)